

NAUKI PODSTAWOWE - 25

NAUKI SPOŁECZNE - 15

OPIEKA PIELĘGNIARSKA I SPECJALISTYCZNA - 60

1. Błona, przez którą zachodzi osmoza to:
2. Samorzutne mieszanie się substancji będące wynikiem chaotycznego ruchu ich cząsteczek to:
3. W patogenezie astmy dochodzi do:
4. Do chorób neurodegeneracyjnych nie zaliczysz:
5. Radioterapia to:
6. Nowoczesną terapią genową w hematoonkologii jest leczenie za pomocą:
7. U krótkowidza o wadzie wzroku -2D punkt leży:
8. Prędkość fali tętna nie zależy od:
9. Do spowolnienia rytmu oddechowego może dojść po podaniu:  
i. Klirens leku to:
  10. Działanie przeczyszczające wykazują:
  11. Lekami przeciwwymiotnymi najczęściej stosowanymi w chorobie lokomocyjnej są:
  12. 30 – letni pacjent z rozległym urazem wielonarządowym został przywieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjent nie posiadał za sobą książeczki zdrowia, w której wpisane były wszystkie przebyte szczepienia. Jaką profilaktykę przeciwwężcową należałoby zastosować?
  13. Jaka podstawa prawna określa definicje zakażenia szpitalnego:
  14. U pacjenta z rozpoznana odrą należy:
  15. Charakterystyczne dla wstrząsu zmiany krążeniowe to:
  16. Zespół metaboliczny to:
  17. Zniszczenie przegród międzypęcherzykowych i zmniejszenie liczby pęcherzyków płucnych, to cechy charakterystyczne:
  18. Rak jest rozrostem komórek tkanki:

19. Jak właściwie chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego na stanowisku pracy?
20. Potencjałem błonowym nazywamy:
21. Patologiczne zmiany w budowie tętnic w trakcie miażdżycy polegają na:
22. Upośledzenie funkcji kory mózgowej w przebiegu choroby Alzheimera związane jest z:
23. Insulinoniezależna postać cukrzycy odznacza się:
24. Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B nie dochodzi poprzez:
25. Edukacja zdrowotna to świadczenie pielęgniarki określone w:
26. Jakie podstawowe procesy społeczne zachodzą w grupie zawodowej pielęgniarek?
27. Jakie występują podstawowe wzory działań społecznych w grupie zawodowej pielęgniarek?
28. Jaka jest różnica między wiedzą naukową socjologiczną a wiedzą zdroworozsądkową?
29. W opiece nad pacjentem z tendencjami suicydalnymi ważna jest:
30. Komponenty postawy to:
31. Podstawowe wzory zachowań (działań) społecznych w grupie wg Szczepańskiego:
32. Jakie podstawowe warunki muszą być spełnione, aby komunikacja była skuteczna?
33. W rodzinie w sytuacji choroby funkcją dominującą jest:
34. Socjalizacja to:
35. Wymień role społeczne pielęgniarki?
36. Koncepcja solidaryzmu społecznego:
37. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia pochodzą m.in. Z:
38. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego (zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku) m.in. Są:
39. Stawka kapitacyjna oznacza, że zakład opieki zdrowotnej otrzymuje wynagrodzenie za:
40. Skierowanie działań I fazy profilaktyki na kilka czynników ryzyka, oddziaływanie na czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz kierowanie działań na jednostkę i otoczenie, w którym żyje to:
41. System oceny ryzyka zawodowego ma istotne znaczenie w procesie:

42. Zdrowie publiczne realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
43. Pacjenta zgłasza się do lekarza POZ z objawami: bólu w wew. Kącikach oczu oraz w okolicy skroniowej. Nasilający się w pozycji leżącej ustępuje po uniesieniu głowy, wydzielina z nosa gęsta cuchnąca ropna. Powyższe objawy mogą świadczyć o:
44. Wśród publicznych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce największy udział (około 90 %) mają wydatki pochodzące z:
45. Profilaktyczne programy przesiewowe:
46. Celem pielęgniarstwa długoterminowego między innymi jest:
47. Zadania pielęgniarki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
48. W zawodzie pielęgniarstwa pojęcie „zespołu wypalenia zawodowego” wiąże się przede wszystkim:
49. Dla rozpoznania zawału mięśnia sercowego NSTEMI decydujące znaczenie mają:
50. Pielęgnowanie nowoczesne różni się od pielęgnowania tradycyjnego. Którą z cech nie zaliczysz do pielęgniarstwa nowoczesnego?
51. Po uciśnięciu żyły opaską uciskową krew do badania należy pobrać w czasie nie dłuższym niż:
52. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:
53. U dziecka z utratą 12% masy ciała w wyniku odwodnienia mogą wystąpić następujące objawy:
54. Który z drobnoustrojów poprzedza zachorowanie na gorączkę reumatyczną u dzieci?
55. Dobowa dawka maksymalna p.o. Dla paracetamolu u dzieci wynosi:
56. U pacjenta leczonego glikozydami nasercowymi pielęgniarka prowadzi obserwację w kierunku:
57. Prowadząc działania edukacyjne u pacjenta z cukrzycą wskażesz na konieczność kontroli hemoglobiny glikowanej:
58. Przygotowując pacjenta do bronchoskopii poinformujesz, aby po badaniu:
59. Do zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji w opiece nad pacjentem z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych nie należą:
60. Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy u ciężarnej jest:
61. Brak oddechu i oznak krążenia u dorosłego poszkodowanego, stanowi podstawę do podjęcia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w schemacie kolejno:

62. Wskaż zdanie błędne dotyczące świadku występującego u chorych objętych opieką paliatywną:
63. Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć:
64. Prowadzenie wywiadu środowiskowego przez pielęgniarkę to świadczenie:
65. Indeks glikemiczny:
66. Leczeniem z wyboru nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór jest:
67. Ile lidokainy znajduje się w 1 ml 2% roztworu:
68. Po planowanym wprowadzeniu kaniuli do układu dużych żył („wkłucie centralne”) należy zawsze wykonać:
69. Opadnięcie kącika ust, spłycenie bruzdy nosowo – wargowej, niedomykalność szpary powiekowej, niemożność marszczenia czoła – to objawy:
70. Pacjent ma zlecone badanie dobowej zbiórki moczu. Do zadań pielęgniarki po zakończeniu zbiórki moczu należy:
71. Czas jaki upływa od zakażenia do chwili pojawienia pierwszych klinicznych objawów choroby to okres:
72. Po zakończeniu transfuzji krwi należy pacjenta obserwować przez:
73. Charakterystyczne pienienie moczu u dziecka jest specyficznym objawem dla:
74. Wykonując badanie diagnostyczne – punktowe testy skórne, w kierunku ustalenia przyczyn alergii pielęgniarka/pielęgniarski powinien pamiętać o przypomnieniu dziecku lub jego rodzicom/opiekunom o odstawieniu leków przeciwhistaminowych na:
75. Do produktów zabronionych w diecie bezglutenowej u dziecka z celiakią zaliczamy:
76. U dziecka z chorobą układu krążenia pierwszorazowy pomiar ciśnienia tętniczego należy przeprowadzić na:
77. Wykonując doustny test tolerancji glukozy (DTTG) pacjentowi do wypicia podasz:
78. Silne bóle kolkowe i pojawiająca się żółtaczka przemawia za:
79. U chorej w pierwszej dobie po założeniu cewnika do żyły głównej wystąpiła duszność. Najbardziej prawdopodobny powód to:
80. Retinopatia to:

81. W wyniku długotrwałego unieruchomienia chorego w łóżku, będącego w wieku podeszłym, mogą szybko wystąpić trudne do rozpoznania powikłania, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, którymi są:
82. W przypadku łożyska przedwcześnie oddzielonego stwierdza się:
83. Badanie standardowe w II trymestrze, w przypadku niepodejrzanego wyniku badania w I trymestrze, wykonuje się w celu oceny:
84. Przy pomocy USG nie można ocenić:
85. W którym tygodniu ciąży wykonuje się test przesiewowy celem wykrycia cukrzycy ciężarnych?
86. Badania profilaktyczne pracowników są finansowane przez:
87. Jeden wymiennik węglowodanowy (1 WW), to taka ilość produktu, która dostarcza:
88. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów jest stosowana u osób z:
89. W leczeniu wstrząsu anafilaktycznego należy podać natychmiast:
90. Oceniając głębokość zaburzeń świadomości wg GSC – najmniejsza liczba punktów, które może uzyskać pacjent to:
91. W pierwszej dobie życia powinno być przeprowadzone szczepienie przeciw:
92. Do typowych objawów zakażenia opon mózgowo – rdzeniowych należą
93. Cukrzyca ciężarnych predysponuje do wystąpienia u dziecka:
94. Jaką drogą można podawać dziecku leki przeciwastmatyczne?
95. Najwłaściwsze postępowanie przy nawale mlecznym to:
96. W przebiegu zwężenia zastawki aortalnej dochodzi do:
97. Objawy nadczynności tarczycy to wszystkie z wyjątkiem:
98. Ocenę bólu u osób w wieku podeszłym dokonuje się z wykorzystaniem:
99. U chorego z wywiadem poalkoholowej marskości wątroby występują objawy nasilonego krwawienia z przewodu pokarmowego. Jako prawdopodobne źródło krwawienia w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę:
100. Który rodzaj komórek w skórze odpowiada za odbiór bodźców bólowych?
101. Nerw czaszkowy II to nerw:
102. Czynniki fizyczne mające wpływ na efekt napromieniania żywego organizmu to między innymi:

103. Zdolność odbierania bodźców zewnętrznych to:
104. Zasady opieki nad chorym chirurgicznym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną to postępowanie w/g protokołu:
105. W przygotowaniu pola operacyjnego do zabiegu, usunięcie owłosienia zalecane jest:
106. Które czynniki nie zwiększają ryzyka zakażenia miejsca operowanego?
107. Które z poniższych operacji nie są operacjami czystymi?
108. Które działania nie zmniejszają ryzyko odleżyn po operacji?
109. Do objawów zakażenia rany pooperacyjnej nie należy:
110. Ilość błonnika pokarmowego w diecie dorosłego człowieka powinna mieścić się w granicach:
111. Niedożywienie u osoby dorosłej diagnozuje się, kiedy BMI wynosi:
112. Zaznacz kaloryczność 1g tłuszczu:
113. Przykładem synergizmu jest połączenie:
114. Wskaż zdanie fałszywe:
115. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące paracetamolu:
116. Która z poniższych cząsteczek nie przechodzi łatwo przez barierę krew-mózg?
117. W jakim miejscu przewodu pokarmowego dochodzi do największego wchłaniania żelaza?
118. Który z poniższych parametrów NIE wpływa bezpośrednio na pojemność minutową serca (CO)?
119. Do chorób genetycznych człowieka wywołanych aberracją chromosomową należy:
120. Do chorób sprzężonych z chromosomem X należą:
121. Plamki Fiłatowa-Koplika to charakterystyczny objaw kliniczny występujący we wczesnym
122. Stadium:
123. Która z wymienionych bakterii nie jest typowym przedstawicielem fizjologicznej flory
124. Przewodu pokarmowego:
125. Leczenie trombolityczne u pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu powinno być rozpoczęte:

126. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w udarach niedokrwiennych nieobjęte leczeniem trombolitycznym:
127. Głównym celem opieki pielęgniarstwa nad pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera jest. Wskaż prawdziwe.
128. Lewodopa jest lekiem podawanym kilka razy dziennie nawet 6 – 7 razy dziennie. Pielęgniarka zwróci szczególną uwagę na ten fakt, ponieważ; wskaż zdanie prawdziwe
129. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem ze SM u którego zalecono dożylnie podanie Metyloprednizolu zwróci szczególną uwagę na; wskaż fałszywe
130. Do czynników wykluczających wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe NIE należą:
131. Ośrodki Pomocy Społecznej wykonują między innymi zadania:
132. Pielęgniarka opieki długoterminowej w ramach NFZ w kwalifikacji do oceny podstawowych czynności życiowych stosuje skalę:
133. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego;
134. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:
135. Zasada podawania leków p/ bólowych „zgodnie z zegarem” polega na podawaniu leków:
136. Który nowotwór nie jest wywoływany wirusem HPV?
137. Narządem, który najczęściej ulega przerzutom nowotworowym jest?
138. Pedagogika jako nauka empiryczna opiera się głównie na:
139. Czym zajmuje się pedagogika ogólna?
140. Pedagogika specjalna zajmuje się przede wszystkim:
141. Który z wymienionych elementów opieki nad dzieckiem z zespołem nerczycowym ma pierwszorzędowe znaczenie:
142. Ocena noworodka według skali Apgar polega na określeniu takich cech jak:
143. Który z wymienionych celów opieki nad dzieckiem z białaczką ma pierwszorzędowe znaczenie:
144. Charakterystycznym objawem występującym w przebiegu kwasicy metabolicznej w cukrzycy typu I jest oddech:
145. Leczenie hemofilii B polega na dożylnym podawaniu:
- Jakich porach rodzice dziecka z mukowiscydozą nie powinni przeprowadzać fizykoterapię układu oddechowego?

146. Pacjent lat 68 leczony z powodu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej został hospitalizowany z powodu zaostrzenia choroby. Z wywiadu wynika, że pacjent pali papierosy. Należy chorego edukować w kierunku zmiany zachowania. Edukację pacjenta należy rozpocząć od przedstawienia:
147. Które stwierdzenie odnośnie badania EKG jest prawdziwe:
148. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególną uwagę zwraca na:
149. Obecność świeżej krwi w stolcu:
150. Co nie należy do zadań podstawowej opieki zdrowotnej
151. Jakie zadania wykonuje pielęgniarka POZ w sytuacji, gdy zdrowie to brak choroby
152. Priorytetem pracy pielęgniarki rodzinnej jest
153. Ile wizyt patronażowych powinna wykonać położna POZ od 1- 6 tygodnia życia dziecka
154. Pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia jest:
155. Brak wskazań do RKO to m.in:
156. W jakich sytuacjach możesz przerwać RKO:
157. Graniczne wartości oddechu dla osoby dorosłej, między którymi podejmiesz decyzję o wentylacji mechanicznej wynoszą:
158. Wskaz fazy I etapu procesu pielęgnowania
159. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące Procesu pielęgnowania
160. Co jest głównym celem promocji zdrowia?
161. Jakie czynniki wg Lalonda mają najmniejszy wpływ na zdrowie? Wskaz dwa
162. Który z poniższych kierunków należy do działań w promocji zdrowia?
163. Schizofrenia, która jest najczęstszą postacią, cechują ją urojenia luźno powiązane, najczęściej o charakterze urojeń prześladowczych, ksobnych, odstąpienia czy oddziaływania oraz omamy głównie słuchowe, zaburzenia napędu (pobudzenie), postawy wielkościowe, niedostosowanie afektywne, to schizofrenia:
164. Czynniki ryzyka zachowań suicydalnych:
165. Podczas stosowania przymusu bezpośredniego należy przestrzegać następujących zasad:
166. Czynniki genetyczne wyjaśniające dłuższe życie kobiet wskazuje na:
167. Zachowanie typu A za pomocą którego człowiek radzi sobie ze stresem obejmuje:

168. Wg Franklina Shontza, w stadium „spotkania z chorobą” człowiek:
169. Jak właściwie chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego na stanowisku pracy?
170. Jak ograniczyć narażenie przy wykonywaniu procedur tomografii komputerowej?
171. W konflikcie społecznym jako teorii socjologicznej podkreśla się znaczenie:
172. Istotą społeczeństwa według interakcjonizmu symbolicznego są dwa elementy:
173. Proces socjalizacji polega na:
174. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla krytykę biomedycznego modelu zdrowia przedstawioną przez Fritjofa Caprę?
175. W modelu salutogenezy „poczucie koherencji” pełni funkcję:
176. Które z poniższych twierdzeń najlepiej opisuje zaletę mandali zdrowia w kontekście promocji zdrowia?
177. Które z poniższych czynników zwiększają ryzyka zakażenia szpitalnego?
178. Które z wymienionych zakażeń są klasyfikowane jako zakażenia szpitalne?
179. ZUM (zakażenie układu moczowego) związane z opieką medyczną najczęściej wynika z:
180. Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia należy:
181. Do chorób neurodegeneracyjnych zaliczysz:
182. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące glikokortykosteroidów:
183. NZK u dorosłego w mechanizmie PEA. PO kolejnej 2 min pętli RKO, podczas kontroli rytmu na monitorze widzisz zapis częstoskurczu komorowego z szerokimi zespołami QRS. Bezzwłocznie:
184. Diazepam (Relanium) – wskaż zdanie fałszywe:
- Przykłady:
- Jest długodziałającą pochodną benzodiazepiny o działaniu nasennym i uspokajającym
  - Nie uzależnia psychicznie i fizycznie
  - Stosowany jest w premedykacji chirurgicznej
  - Nie stosujemy się go do zmniejszania napięcia mięśniowego
185. Wskaż zdanie fałszywe:
- Przykłady:

- Zgłaszanie niepożądanych działań leków dotyczy osoby wykonującej zawód medyczny
- Monitorowanie działań niepożądanych nie dotyczy m.in. Produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną, dopuszczoną do obrotu nie dłużej niż 5 lat
- Monitorowaniem działań niepożądanych w Polsce zajmuje się m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Baktteriobójczych
- Należy zgłaszać wszystkie niepożądane działania po lekach zarejestrowanych w Polsce

186. Celem przedoperacyjnej głodówki pacjenta jest:

187. Które z wymienionych procedur wymagają zachowania ścisłej aseptyki?

188. Który z poniższych parametrów wpływa bezpośrednio na pojemność minutową serca (CO)?